nieuws

Blauwtongvirus duikt opnieuw op in Komen

nieuws

Bij een landbouwbedrijf in Komen in de provincie Henegouwen is het eerste geval van blauwtong van dit jaar opgedoken. Net zoals in de zomers van 2006 en 2007 gaat het opnieuw om het blauwtongvirus type 8. Hoewel het opduiken van het virus geen nieuwe maatregelen vergt, wil het Voedselagentschap toch nog eens de aandacht te vestigen op de vaccinatiecampagne die in mei van dit jaar tegen de ziekte werd gelanceerd. Vaccinatie is het enige efficiënte middel om schapen en runderen tegen blauwtong te beschermen, luidt het.

29 JULI 2008 – LAATST BIJGEWERKT OM 4 APRIL 2020 14:44

Bij een landbouwbedrijf in Komen in de provincie Henegouwen is het eerste geval van blauwtong van dit jaar opgedoken. Net zoals in de zomers van 2006 en 2007 gaat het opnieuw om het blauwtongvirus type 8. Hoewel het opduiken van het virus geen nieuwe maatregelen vergt, wil het Voedselagentschap toch nog eens de aandacht te vestigen op de vaccinatiecampagne die in mei van dit jaar tegen de ziekte werd gelanceerd. Vaccinatie is het enige efficiënte middel om schapen en runderen tegen blauwtong te beschermen, luidt het.

Ook in de zomers van 2006 en 2007 dook het virus al op en daarom is deze uitbraak niet helemaal onverwacht. In 2007 trof blauwtong nog 6.870 landbouwbedrijven, in 2006 werden er 695 gevallen geregistreerd. De ziekte is niet gevaarlijk voor de mens maar veroorzaakt wel ernstige economische verliezen doordat ze voor een verhoogde sterfte en groot productieverlies zorgt bij herkauwers als schapen en runderen.

De vaccinatiecampagne 2008 voorziet in het verplicht vaccineren van alle schapen en runderen, inbegrepen bizons en buffels, maar uitgezonderd vleeskalveren. Daarbij moeten alle dieren geboren vóór 1 september 2008 gevaccineerd worden vóór 31 december 2008. Een dier is pas optimaal beschermd is, wanneer het op een correcte en volledige manier gevaccineerd werd. Voor een schaap volstaat daarbij één enkele

injectie. Bij een rund moeten evenwel 2 doses toegediend worden met 3 tot 4 weken tussentijd.
Bij het geval in Komen betrof het een dier dat slechts de eerste dosis had gekregen. Hoogstwaarschijnlijk werd het dier besmet kort voor of na de eerste inenting. De dieren moeten zo vroeg mogelijk gevaccineerd worden best vóór de zomermaanden zodat ze voldoende tijd krijgen om immuniteit op te bouwen. Tot nog toe werden al meer dan 1,3 miljoen vaccinaties geregistreerd bij het Voedselagentschap.(GL)

VILT vzw

Bd Simon Bolivar 17
1000 Bruxelles

Contact

M • info@vilt.be

Volg ons op:

screenreader.visit us on our facebook page: https://www.facebook.com/vilt.nieuws/
screenreader.visit us on our linkedin page: https://www.linkedin.com/company/vilt-vzw/
screenreader.visit us on our instagram page: https://www.instagram.com/vilt.nieuws
screenreader.visit us on our x page: https://x.com/vilt_nieuws
screenreader.visit us on our bluesky page: https://bsky.app/profile/viltnieuws.bsky.social

---

© 2026 VILT vzw, all rights reserved |
Privacy policy
Copyright
Cookie Policy
Cookie instellingen aanpassen
Crafted by Brigada