

Helft van Nederlandse weidevogels wordt opgegeten

nieuws

Meer dan de helft van de jonge weidevogels in Nederland belandt in de maag van roofdieren. Voor een kwart van de eieren geldt hetzelfde. Kuikensterfte wordt gezien als de belangrijkste oorzaak van de achteruitgang van het weidevogelbestand, dat sinds 2000 vijf procent bedraagt. Dat blijkt uit een uitgebreid, meerjarig Nederlands onderzoek naar het lot van weidevogels.

🕒 13 MAART 2006 – LAATST BIJGEWERKT OM 4 APRIL 2020 14:32

Meer dan de helft van de jonge weidevogels in Nederland belandt in de maag van roofdieren. Voor een kwart van de eieren geldt hetzelfde. Kuikensterfte wordt gezien als de belangrijkste oorzaak van de achteruitgang van het weidevogelbestand, dat sinds 2000 vijf procent bedraagt. Dat blijkt uit een uitgebreid, meerjarig Nederlands onderzoek naar het lot van weidevogels.

Tijdens het onderzoek zijn nesten geobserveerd met camera's en temperatuursensoren, en zijn jonge grutto's en kieviten uitgerust met zendertjes. Er is niet één diersoort aan te wijzen als grootste boosdoener, ook de vos en de kraai niet. Er zijn minstens twintig roofdieren die het op weidevogels voorzien hebben. Bestrijding van bepaalde soorten roofdieren is dan ook niet de oplossing voor het probleem van het teruglopende weidevogelbestand, aldus de onderzoekers.

VILT vzw

Bd Simon Bolivar 17

1000 Bruxelles

Contact

M • info@vilt.be

Volg ons op:

 screenreader.visit us on our facebook page: <https://www.facebook.com/vilt.nieuws/>

 screenreader.visit us on our linkedin page: <https://www.linkedin.com/company/vilt-vzw/>

 screenreader.visit us on our instagram page: <https://www.instagram.com/vilt.nieuws>

 screenreader.visit us on our x page: https://x.com/vilt_nieuws

 screenreader.visit us on our bluesky page:
<https://bsky.app/profile/viltnieuwbsky.social>

© 2026 VILT vzw, all rights reserved |

[Privacy policy](#)

[Copyright](#)

[Cookie Policy](#)

[Cookie instellingen aanpassen](#)

Webdesign by Who Owns The Zebra