nieuws

Nieuwe blauwtongcijfers: In welke gevallen is vaccineren verstandig?

nieuws

De afgelopen week zijn 417 veebedrijven getroffen door het blauwtongvirus. Dat blijkt uit de laatste cijfers van Sciensano. FAVV raadt aan om dieren te vaccineren, tenzij het virus reeds binnen het beslag aanwezig is. Ook ontworming mag niet vergeten worden. Door de vochtige zomer zijn er veel schapen met haemonchus, een gastro-intestinale aandoening. Wanneer een verzwakt dier een blauwtonginfectie oploopt, vergroot de kans op een fatale afloop.

9 SEPTEMBER 2024

Ruben De Keyzer

Lees meer over:
blauwtong
schaap
dierziekten



Het blauwtongvirus komt voor bij runderen, schapen en andere herkauwers, vaak met een dodelijke afloop. Er zijn vaccinatiecampagnes aan de gang om het virus in te dijken. Maar is het ook verstandig om te vaccineren terwijl het virus volop door Vlaanderen raast? Jawel, zo legt het FAVV uit, tenzij het virus al binnen uw beslag aanwezig is.


Slim vaccineren

Volgens Liesbeth Van de Voorde (FAVV) kan men dieren met een gerust hart tegen blauwtong vaccineren. Het duurt even voor een vaccin in werking treedt, maar zelfs wanneer een dier kort na vaccinatie een natuurlijke besmetting oploopt, zal dit niet fataal aflopen. Wel is het heel belangrijk dat de dieren niet ziek zijn terwijl ze gevaccineerd worden. Ze mogen dus geen koorts hebben of klinische symptomen vertonen. “Bevinden er zich in het beslag al één of meerdere dieren met symptomen, dan dient er overwogen te worden om niet meer te vaccineren”, zegt Van de Voorde. “De dieren waar nog geen klinische symptomen te zien zijn, zitten misschien al in de incubatieperiode. Zijn de dieren al ziek op het moment van de vaccinatie dan is het mogelijk dat ze daarop slecht reageren omdat ze door een verminderde weerstand geen antistoffen kunnen opbouwen.”
FAVV benadrukt ook dat het belangrijk is om bij elke vaccinatie een nieuwe naald te gebruiken. Anders is het mogelijk dat de ziekte per naald wordt overgedragen. Ook een dier dat nog geen symptomen vertoont, kan ziek zijn.


Voor schapenhouders is vaccinatie echter niet de eerste zorg. “Bij schapen zijn momenteel, door de droge en vochtige zomer, veel haemonchus (gastro-intestinale nematode) besmettingen”, zegt Van de Voorde.” Deze dieren hebben sowieso een mindere weerstand en een bijkomende besmetting met blauwtong kan dan fataal aflopen. Als ze niet recent ontwormd werden, zal een ontworming eerder aan de orde zijn dan een vaccinatie.”

Daling in het verschiet?

In de eerste week van september (2/09 tot 6/09) heeft Sciensano 417 besmettingshaarden gemeten. Eén besmetting omvat meerdere dieren. In de periode van 26 augustus tot 1 september telde Sciensano 634 besmettingen. Toch is het onvoorzichtig om van een daling te spreken, want de nieuwste dataset bevat nog geen cijfers van het weekend. Volgens Sciensano is het dus te vroeg om conclusies te trekken.



In de periode 26/08-1/09 werden 634 haarden vastgesteld. Foto: Sciensano



In de periode 2/09-6/09 werden 417 haarden vastgesteld. Dat zijn er minder, maar let wel: het gaat hier om een kortere periode, zonder het weekend. Foto: Sciensano



Uitgelicht

Eerste blauwtonginfectie in Verenigd Koninkrijk

nieuws

Het aantal blauwtonginfecties in Noord-Europa blijft toenemen. Het Verenigd Koninkrijk kent dit vectorseizoen zijn eerste blauwtongbesmetting. Het gaat om een veebedrijf in Ha...

29 AUGUSTUS 2024

Lees meer

VILT vzw

Bd Simon Bolivar 17

1000 Bruxelles

Contact

M • info@vilt.be

Volg ons op:

screenreader.visit us on our facebook page: https://www.facebook.com/vilt.nieuws/

screenreader.visit us on our linkedin page: https://www.linkedin.com/company/vilt-vzw/

screenreader.visit us on our instagram page: https://www.instagram.com/vilt.nieuws
screenreader.visit us on our x page: https://x.com/vilt_nieuws
screenreader.visit us on our bluesky page: https://bsky.app/profile/viltnieuws.bsky.social

---

© 2026 VILT vzw, all rights reserved |
Privacy policy
Copyright
Cookie Policy
Cookie instellingen aanpassen

Crafted by Brigada