

# Aantal proefdieren in 2003 gedaald met 2,6%

nieuws

Het aantal proefdieren in 2003 vertoont een daling van 2,6 procent tegenover 2002, zo blijkt uit de jaarlijkse statistieken betreffende het proefdiergebruik in België. In 2003 werden er in de 388 erkende laboratoria bij proefexperimenten in totaal 676.564 dieren gebruikt.

🕒 14 JULI 2004 – LAATST BIJGEWERKT OM 14 SEPTEMBER 2020 13:53

Het aantal proefdieren in 2003 vertoont een daling van 2,6 procent tegenover 2002, zo blijkt uit de jaarlijkse statistieken betreffende het proefdiergebruik in België. In 2003 werden er in de 388 erkende laboratoria bij proefexperimenten in totaal 676.564 dieren gebruikt.

Knaagdieren en konijnen zijn daarbij veruit het meest vertegenwoordigd (93 procent), gevolgd door koudbloeddieren zoals vissen, reptielen en amfibieën (4 procent), en vogels (2 procent). Specifieke diersoorten zoals honden, katten en apen vertegenwoordigen respectievelijk 0,15 procent, 0,01 procent en 0,04 procent.

De proeven werden voornamelijk uitgevoerd bij onderzoek en ontwikkeling (39 procent van het aantal) en anderzijds bij productie en kwaliteitscontrole (24 procent) van producten en apparaten gebruikt in de humane en veterinaire geneeskunde.

Op 7 procent van de dieren werden toxicologische en veiligheidsproeven uitgevoerd. Het aantal dieren in veiligheidstesten gedurende 2000-2003 (47.308) is licht gedaald in vergelijking met het jaar 2002 (52.084). Het merendeel van de toxicologische proeven gebeurt op medisch domein. Een beperkt aantal vissen (1366) werd gebruikt in het kader van registratie van pesticiden. Net als vorige jaren werd ook in 2003 geen enkel dier gebruikt voor de erkenning of registratie van cosmetische producten.

Uit analyse van de statistische tabellen sedert 1997 blijkt dat er tussen 1997 en 2000 een belangrijke vermindering van het aantal en de gebruikte soorten proefdieren kan worden vastgesteld. Sindsdien is het aantal proefdieren nagenoeg constant gebleven.

Het aantal gebruikte carnivoren en landbouwhuisdieren kent een gestadige daling en ook bij de primaten is er een belangrijke daling merkbaar. Zo werden in 2003 ongeveer 50 procent minder apen gebruikt dan het jaar voordien dankzij het in gebruik nemen van een alternatieve productiemethode voor de aanmaak van vaccins.

De daling binnen bepaalde soorten in deze periode wordt deels gecompenseerd door het meergebruik van onder andere vogels en koudbloeddieren zoals vissen en amfibieën. Deze laatste soorten worden vooral gebruikt in het onderzoek naar embryonale ontwikkeling, bloed- en spierziekten en de ziekte van Alzheimer.

*Bron: Belga*

**Bron:** Belga

## VILT vzw

Bd Simon Bolivar 17  
1000 Bruxelles

## Contact

M • [info@vilt.be](mailto:info@vilt.be)

## Volg ons op:

screenreader.visit us on our facebook page: <https://www.facebook.com/vilt.nieuws/>

screenreader.visit us on our linkedin page: <https://www.linkedin.com/company/vilt-vzw/>

screenreader.visit us on our instagram page: <https://www.instagram.com/vilt.nieuws>

screenreader.visit us on our x page: [https://x.com/vilt\\_nieuws](https://x.com/vilt_nieuws)

screenreader.visit us on our bluesky page: <https://bsky.app/profile/viltnieuws.bsky.social>

---

© 2026 VILT vzw, all rights reserved |

[Privacy policy](#)

[Copyright](#)

[Cookie Policy](#)

[Cookie instellingen aanpassen](#)

Webdesign by [Who Owns The Zebra](#)