

# Alleen massaal vaccineren verlost Europa van blauwtong

nieuws

Op vraag van de Europese Commissie heeft voedselveiligheidsautoriteit EFSA zich over de voorzorgsmaatregelen tegen blauwtong gebogen. Om elk risico op verspreiding van de dierziekte uit te sluiten, zou blauwtong volledig uitgeroeid moeten worden. Dat is geen gemakkelijke opgave. Het vergt een massale vaccinatiecampagne die gedurende minstens vijf jaar 95 procent van alle rundvee en schapen bestrijkt. Gevolgd door een monitoringsprogramma dat in staat is om een minimale viruscirculatie, bij minder dan één procent van de gevoelige dieren, te kunnen signaleren. Momenteel luidt het advies aan veehouders in eigen land om te vaccineren aangezien Frankrijk geteisterd wordt door blauwtong en nieuwe haarden een paar keer kort bij de Belgische grens opdoken.

🕒 10 MAART 2017 – LAATST BIJGEWERKT OM 14 SEPTEMBER 2020 14:39

Lees meer over:  
dierziekten

Op vraag van de Europese Commissie heeft voedselveiligheidsautoriteit EFSA zich over de voorzorgsmaatregelen tegen blauwtong gebogen. Om elk risico op verspreiding van de dierziekte uit te sluiten, zou blauwtong volledig uitgeroeid moeten worden. Dat is geen gemakkelijke opgave. Het vergt een massale vaccinatiecampagne die gedurende minstens vijf jaar 95 procent van alle rundvee en schapen bestrijkt. Gevolgd door een monitoringsprogramma dat in staat is om een minimale viruscirculatie, bij minder dan één procent van de gevoelige dieren, te kunnen signaleren. Momenteel luidt het advies aan veehouders in eigen land om te vaccineren aangezien Frankrijk geteisterd wordt door blauwtong en nieuwe haarden een paar keer kort bij de Belgische grens opdoken.

In een advies aan de Europese Commissie stelt EFSA dat massaal vaccineren de enige manier is om de dierziekte blauwtong uit te roeien. Vijf opeenvolgende jaren zou 95 procent van de schapen en runderen gevaccineerd moeten worden. Om te voorkomen dat de ziekte daarna toch weer de kop op steekt, is vervolgens een uitbreiding van het monitoringssysteem nodig om minimale viruscirculatie,

te kunnen signaleren. De Europese beleidsmakers zullen dit in het achterhoofd houden wanneer zij het bestrijdingsprogramma voor blauwtong herzien. Later dit jaar wil EFSA ook de verschillende types blauwtong kunnen karakteriseren zodat beschermingsmaatregelen meer gericht uitgevaardigd kunnen worden.

Uit het onderzoek van EFSA blijkt dat de antistoffen die pasgeboren dieren meekrijgen de werking van een vaccin gedurende de eerste drie levensmaanden kunnen belemmeren. Daardoor kan vaccinatie in die periode geen effect hebben. Een dier is meestal 21 dagen na de tweede enting immuun. Sommige soorten van de knutten die de ziekte overbrengen zijn het hele jaar door actief, vooral in de gebieden met een milde winter zoals het Middellandse Zeegebied. Hier kan het virus op elk moment overgebracht worden. In koudere gebieden, zoals in Noord-Europa, zijn de knutten in de drie wintermaanden inactief.

**Meer info: [EFSA](#)**

**In samenwerking met:** Boerderij

## VILT vzw

Bd Simon Bolivar 17  
1000 Bruxelles

## Contact

M • [info@vilt.be](mailto:info@vilt.be)

## Volg ons op:

screenreader.visit us on our facebook page: <https://www.facebook.com/vilt.nieuws/>

screenreader.visit us on our linkedin page: <https://www.linkedin.com/company/vilt-vzw/>

screenreader.visit us on our instagram page: <https://www.instagram.com/vilt.nieuws>

screenreader.visit us on our x page: [https://x.com/vilt\\_nieuws](https://x.com/vilt_nieuws)

screenreader.visit us on our bluesky page: <https://bsky.app/profile/viltnieuws.bsky.social>

[Cookie Policy](#)

[Cookie instellingen aanpassen](#)

Webdesign by [Who Owns The Zebra](#)