

Doorbraak in bestrijding runderslaapziekte

nieuws

Onderzoekers van het Tropisch Instituut voor Geneeskunde (ITG) in Antwerpen zijn er samen met collega's uit ontwikkelingslanden in geslaagd om de slaapziekteparasiet opnieuw vatbaar te maken voor geneesmiddelen. Runderslaapziekte is volgens Wereldlandbouworganisatie FAO een belangrijke oorzaak van armoede op het Afrikaanse platteland.

🕒 29 SEPTEMBER 2010 – LAATST BIJGEWERKT OM 14 SEPTEMBER 2020 14:13

Lees meer over:

rundveehouderij

dierziekten

▫

Onderzoekers van het Tropisch Instituut voor Geneeskunde (ITG) in Antwerpen zijn er samen met collega's uit ontwikkelingslanden in geslaagd om de slaapziekteparasiet opnieuw vatbaar te maken voor geneesmiddelen. Runderslaapziekte is volgens Wereldlandbouworganisatie FAO één van de belangrijkste oorzaken van armoede op het Afrikaanse platteland.

De parasiet treft niet alleen mensen, maar Trypanosoma congolense veroorzaakt ook slaapziekte bij het vee waarvan miljoenen mensen in Afrika afhankelijk zijn. De parasiet richt er enorme schade aan omdat hij resistent is tegen alle op dit ogenblik beschikbare geneesmiddelen. De drie bestaande geneesmiddelen tegen runderslaapziekte zijn zo goed als waardeloos geworden. Nagana, zoals de runderslaapziekte genoemd wordt, is volgens de Wereldlandbouworganisatie FAO een van de belangrijkste oorzaken van armoede op het Afrikaanse platteland.

De parasiet ontwikkelde een manier om de drie bestaande geneesmiddelen uit zijn cellen naar buiten te pompen. De wetenschappers zijn daarom op zoek gegaan naar stoffen die de 'pomp' zouden kunnen saboteren. Uiteindelijk vonden ze twee stoffen die het bijna onwerkzaam geworden ISM (isometamidium chloride) terug effect kunnen geven. Beide stoffen zijn - ook in ontwikkelingslanden betaalbare - antibiotica, oxytetracycline en enrofloxacin. Apart doen ze niets tegen slaapziekte, maar samen met ISM blijken ze dodelijk voor de parasiet.

De onderzoekers testten hun aanpak al op runderen. Ze besmetten drie groepen van telkens zes runderen met resistente trypanosomen om ze vervolgens te behandelen. De runderen die alleen met

ISM behandeld werden, kregen zonder uitzondering slaapziekte. Van de runderen die ISM plus één van beide antibiotica kregen, genas de helft volledig. Bij de andere helft bleef de parasiet aanwezig, maar in nauwelijks detecteerbare aantallen.

Bij een ziekte die in zwart Afrika jaarlijks drie miljoen runderen het leven kost, vaak in gebieden waar de eigenaars van de runderen sowieso al moeite hebben om te overleven, is het verschil enorm, aldus het ITG.

Bron: Belga

VILT vzw

Bd Simon Bolivar 17

1000 Bruxelles

Contact

M • info@vilt.be

Volg ons op:

screenreader.visit us on our facebook page: <https://www.facebook.com/vilt.nieuws/>

screenreader.visit us on our linkedin page: <https://www.linkedin.com/company/vilt-vzw/>

screenreader.visit us on our instagram page: <https://www.instagram.com/vilt.nieuws>

screenreader.visit us on our x page: https://x.com/vilt_nieuws

screenreader.visit us on our bluesky page: <https://bsky.app/profile/viltnieuws.bsky.social>

© 2026 VILT vzw, all rights reserved |

[Privacy policy](#)

[Copyright](#)

[Cookie Policy](#)

[Cookie instellingen aanpassen](#)

Webdesign by [Who Owns The Zebra](#)