

"Gevolgen van droogte kunnen tegen 2030 enorm zijn"

nieuws

ARGUSactueel, de nieuwsbrief van het milieupunt van KBC en Cera, brengt verslag uit over de studie van de gerenommeerde klimaatwetenschapper Aiguo Dai waarin hij waarschuwt dat grote delen van de planeet de komende 30 jaar al met ernstige droogte te kampen kunnen hebben als gevolg van de opwarming van de aarde.

🕒 4 NOVEMBER 2010 – LAATST BIJGEWERKT OM 14 SEPTEMBER 2020 14:13

▫ **ARGUSactueel**, de nieuwsbrief van het milieupunt van KBC en Cera, brengt verslag uit over de studie van de gerenommeerde klimaatwetenschapper Aiguo Dai waarin hij waarschuwt dat grote delen van de planeet de komende 30 jaar al met ernstige droogte te kampen kunnen hebben als gevolg van de opwarming van de aarde.

Klimaatwetenschapper **Aiguo Dai** van het Amerikaanse National Center for Atmospheric Research (UCAR) werkte in 2004 mee aan een studie waaruit vaak wordt geciteerd als het over klimaatwijziging gaat. Hij kwam toen tot de conclusie dat de totale landoppervlakte die wereldwijd door zware droogte getroffen is, meer dan verdubbeld is van 1970 tot de jaren 2000.

Dai's nieuwe studie kijkt vooruit en draait rond de vraag hoe de klimaatwijziging precies de toekomstige droogtes zal beïnvloeden. Droogte is een complex fenomeen. Of een daling van de neerslag daadwerkelijk tot droogte leidt, hangt onder meer af van de temperatuur en van de verdampingsnelheid. Dai baseerde zich op de resultaten van 22 computermodellen die het VN-klimaatrapport in 2007 heeft gebruikt. Dat leverde prognoses op over onder meer temperatuur, neerslag, vochtigheid en windsnelheid, vertrekkende van de meest recente prognoses voor de uitstoot van broeikasgassen zoals CO₂.

Met al die gegevens berekende Dai de toekomstige droogte-index van de verschillende regio's, de zogeheten Palmer Drought Severity Index (PDSI), een van de meest accurate en meest aanvaardbare manieren om droogte te meten. Een index van -0,5 wordt als normaal bestempeld. Als de index tot -4 zakt, spreekt men van ernstige droogte.

Gebieden die tegen 2030 met ernstige droogte te maken kunnen hebben, zijn grote delen van de Verenigde Staten, Latijns-Amerika, het Middellandse Zeegebied, Zuid-Azië, Afrika en Australië. Voor de Verenigde Staten bijvoorbeeld kan de droogte-index naar -4 tot -6 zakken in een groot deel

van het centrum en het westen van het land. Aan de Middellandse Zee kan men dan al aan -8 of lager zitten.

In sommige regio's kan de droogte tegen het eind van deze eeuw een nooit eerder geziene piek bereikt hebben. In een groot deel van het Middellandse Zeegebied kan de index dan dalen tot -15 en zelfs -20. In Noord-Europa, Rusland, Canada en Alaska en enkele regio's op het zuidelijk halfrond kan het droogterisico dalen, is een andere vaststelling in Dai's studie.

Dai heeft het over "de mogelijkheid van een wijdverspreide droogte de komende jaren". Of het echt zover komt, hangt af van de evolutie van de verwachte CO2-uitstoot en van natuurlijke klimaatfenomenen zoals El Niño. "Als de projecties in deze studie zelfs maar in de buurt komen van de werkelijkheid, dan zullen de gevolgen voor de samenleving over de hele wereld enorm zijn", zegt Dai.

Bron: ARGUSactueel

VILT vzw

Bd Simon Bolivar 17

1000 Bruxelles

Contact

M • info@vilt.be

Volg ons op:

screenreader.visit us on our facebook page: <https://www.facebook.com/vilt.nieuws/>

screenreader.visit us on our linkedin page: <https://www.linkedin.com/company/vilt-vzw/>

screenreader.visit us on our instagram page: <https://www.instagram.com/vilt.nieuws>

screenreader.visit us on our x page: https://x.com/vilt_nieuws

screenreader.visit us on our bluesky page: <https://bsky.app/profile/viltnieuws.bsky.social>

© 2026 VILT vzw, all rights reserved |

[Privacy policy](#)

[Copyright](#)

[Cookie Policy](#)

[Cookie instellingen aanpassen](#)

Webdesign by Who Owns The Zebra