

Maiswortelboorder aangetroffen in Zaventem

nieuws

In de omgeving van de luchthaven van Zaventem is de maiswortelboorder aangetroffen, een insect dat in maïsvelden grote schade kan aanrichten. Dat laat het Voedselagentschap (FAVV) weten. Het is de eerste keer sinds 2004 dat de maiswortelboorder gesignaleerd wordt in België. Het vervloekte diertje drong in de jaren 90 via Servië Europa binnen en heeft zich intussen geïnstalleerd in een groot deel van de EU.

🕒 29 JULI 2014 – LAATST BIJGEWERKT OM 4 APRIL 2020 15:16

Lees meer over:

akkerbouw



In de omgeving van de luchthaven van Zaventem is de maiswortelboorder aangetroffen, een insect dat in maïsvelden grote schade kan aanrichten. Dat laat het Voedselagentschap (FAVV) weten. Het is de eerste keer sinds 2004 dat de maiswortelboorder gesignaleerd wordt in België. Het vervloekte diertje drong in de jaren 90 via Servië Europa binnen en heeft zich intussen geïnstalleerd in een groot deel van de EU.

Bij een routinemonitoring van het FAVV zijn op een perceel in de omgeving van de luchthaven van Zaventem volwassen maiswortelboorders aangetroffen. De larven van deze kever kunnen aanzienlijke schade veroorzaken in de maïsteelt. Het FAVV heeft rond het getroffen perceel een focuszone met een straal van 1 km en een veiligheidszone met een straal van 6 km afgebakend. Binnen deze zones zijn maatregelen van kracht die de verspreiding van de kever moeten tegengaan. De betrokken landbouwers werden op de hoogte gebracht.

De maiswortelboorder is niet te verwarren met de Europese maïsstengelboorder, een rups van een vlinder die zich een weg vreet door stengel en kolf naar de maïswortel. De eitjes van de wortelboorders worden bij de wortels van de maïsplanten gelegd, en de larven voeden zich met de maïswortels. Bij ernstige aantasting kunnen de maïsplanten omvallen en zijn de opbrengstverliezen aanzienlijk: gemiddeld gaat 6,5 tot 13 procent van de opbrengst verloren, maar ook hogere oogstverliezen zijn mogelijk.

Aangezien de larven van de maiswortelboorder volledig afhankelijk zijn van maïs en ze niet in andere gewassen kunnen overleven, is gewasrotatie de meest aangewezen en efficiënte manier om deze ongewenste gast definitief te verbannen. Monocultuur, waarbij twee (of meer) opeenvolgende jaren maïs wordt verbouwd op hetzelfde perceel, is uit den boze. Er zijn ook insecticides voorhanden die komaf maken met de kever.

De maiswortelboorder is ongeveer 6 à 7 millimeter lang, groen van kleur met in de lengte drie donkere strepen over de rug. Als de strepen elkaar overlappen, lijken de vleugels bruin of zwart van kleur. Eitjes en larven zijn met het blote oog moeilijk waarneembaar. Het insect is afkomstig uit de Verenigde Staten en kwam in de jaren 90 in Europa terecht via Servië. Het kan zich op een jaar 30 tot 40 km verplaatsen, en verspreidde zich over heel Europa mede dankzij transport. Het is dan ook niet onlogisch dat de maïskever meestal in de buurt van luchthavens wordt geseind.

In België werden in 2003 69 kevers waargenomen, en ook in 2004 zijn maiswortelboorders aangetroffen in Kampenhout, Kortenberg en Kraainem. Sinds 2005 werden geen maïskevers meer ontdekt in België. In Europa werd het quarantainestatuuat van de maiswortelboorder, net als de Europese noodmaatregelen, begin 2014 opgeheven. In België zijn de maatregelen van het FAVV steeds van kracht gebleven.

VILT vzw

Bd Simon Bolivar 17
1000 Bruxelles

Contact

M • info@vilt.be

Volg ons op:

screenreader.visit us on our facebook page: <https://www.facebook.com/vilt.nieuws/>

screenreader.visit us on our linkedin page: <https://www.linkedin.com/company/vilt-vzw/>

screenreader.visit us on our instagram page: <https://www.instagram.com/vilt.nieuws>

screenreader.visit us on our x page: https://x.com/vilt_nieuws

screenreader.visit us on our bluesky page: <https://bsky.app/profile/viltnieuws.bsky.social>

© 2026 VILT vzw, all rights reserved |

[Privacy policy](#)

[Copyright](#)

[Cookie Policy](#)

[Cookie instellingen aanpassen](#)

Webdesign by Who Owns The Zebra