

Nederlandse onderzoekers bewijzen gevaar acrylamide

nieuws

Acrylamide in het eten verhoogt de kans op baarmoeder- en eierstokkanker. Dat blijkt uit Nederlands onderzoek, meldt het NRC Handelsblad. Het is voor het eerst dat bij mensen een verhoogd risico op kanker door acrylamide wordt aangetoond. Tot dusver was het voedselbestanddeel alleen bij proefdieren kankerverwekkend gebleken. Acrylamide zit in voedingsproducten zoals chips, frieten, peperkoek, speculaas, crackers en brood.

🕒 19 NOVEMBER 2007 – LAATST BIJGEWERKT OM 14 SEPTEMBER 2020 14:01

Acrylamide in het eten verhoogt de kans op baarmoeder- en eierstokkanker. Dat blijkt uit Nederlands onderzoek, meldt het NRC Handelsblad. Het is voor het eerst dat bij mensen een verhoogd risico op kanker door acrylamide wordt aangetoond. Tot dusver was het voedselbestanddeel alleen bij proefdieren kankerverwekkend gebleken. Acrylamide zit in voedingsproducten zoals chips, frieten, peperkoek, speculaas, crackers en brood.

Zweedse onderzoekers ontdekten vijf jaar geleden bij toeval dat er acrylamide zit in gebakken voeding waarin meel en suiker zijn verwerkt. Onderzoekers van de universiteit van Maastricht, de Nederlandse voedselinspectie en de onderzoeksorganisatie TNO hebben nu uit bevolkingsonderzoek geconcludeerd dat vrouwen die veel acrylamide eten hun kans op eierstok- en baarmoederkans verdubbelen, van ongeveer 1,5 naar 3 procent. Met borstkanker was er geen verband, rapporteren de onderzoekers in het vakblad *Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention*.

De vorsers gaan nu bekijken of ook tumoren van nier, (slok)darm, maag, blaas, prostaat en long vaker voorkomen bij mensen die veel friet, chips of ander acrylamidebevattend voedsel eten. In veel landen zijn de overheid en de voedingsindustrie uit voorzorg gaan kijken of het gehalte acrylamide in voedsel teruggedrongen kan worden. Eerder dit jaar meldde de Gentse docent Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit Bruno De Meulenaer

dat in frieten en chips van Belgische producenten beduidend minder kankerverwekkende stoffen zitten dan vijf jaar geleden.(KS)

Meer informatie: [A Prospective Study of Dietary Acrylamide Intake and the Risk of Endometrial, Ovarian, and Breast Cancer](#)

Bron: Het Nieuwsblad</i>

VILT vzw

Bd Simon Bolivar 17
1000 Bruxelles

Contact

M • info@vilt.be

Volg ons op:

 screenreader.visit us on our facebook page: <https://www.facebook.com/vilt.nieuws/>

 screenreader.visit us on our linkedin page: <https://www.linkedin.com/company/vilt-vzw/>

 screenreader.visit us on our instagram page: <https://www.instagram.com/vilt.nieuws>

 screenreader.visit us on our x page: https://x.com/vilt_nieuws

 screenreader.visit us on our bluesky page:
<https://bsky.app/profile/viltnieuws.bsky.social>

© 2026 VILT vzw, all rights reserved |

[Privacy policy](#)

[Copyright](#)

[Cookie Policy](#)

[Cookie instellingen aanpassen](#)

Webdesign by Who Owns The Zebra