

Resistentie is beperkt bij antibiotica van levensbelang

nieuws

Dat resistente bacteriën een bedreiging zijn voor de effectiviteit van antibiotica en dus ook voor onze gezondheid weten we al langer. Cijfermateriaal van voedselveiligheidsautoriteit EFSA en ziektecontrolecentrum ECDC toont aan hoe acuut het probleem is. Zowel bij mens als dier werden salmonellabacteriën aangetroffen die resistent zijn tegen een resem veelgebruikte antibiotica. De percentages liegen er niet om: 32 procent van de bacteriën bij de mens, 56 procent bij vleeskippen, 73 procent bij kalkoenen en 38 procent bij vleesvarkens. Voor campylobacter is het probleem gelijkaardig, maar gelukkig zijn beide zoönoses vrijwel nooit bestand tegen 'superantibiotica' die voor de humane geneeskunde van kritisch belang zijn.

© 27 FEBRUARI 2015 – LAATST BIJGEWERKT OM 4 APRIL 2020 15:20

Lees meer over:

pluimveehouderij

dierziekten

gezondheid



Dat resistente bacteriën een bedreiging zijn voor de effectiviteit van antibiotica en dus ook voor onze gezondheid weten we al langer. Cijfermateriaal van voedselveiligheidsautoriteit EFSA en ziektecontrolecentrum ECDC toont aan hoe acuut het probleem is. Zowel bij mens als dier werden salmonellabacteriën aangetroffen die resistent zijn tegen een resem veelgebruikte antibiotica. De percentages liegen er niet om: 32 procent van de bacteriën bij de mens, 56 procent bij vleeskippen, 73 procent bij kalkoenen en 38 procent bij vleesvarkens. Voor campylobacter is het probleem gelijkaardig, maar gelukkig zijn beide zoönoses vrijwel nooit bestand tegen 'superantibiotica' die voor de humane geneeskunde van kritisch belang zijn.

De bevindingen van EFSA en ECDC in verband met resistente bacteriën zijn verontrustend en geruststellend tegelijk. Verontrustend omdat data van 2013 uitwijzen dat het lastig dreigt te worden om ernstige voedselinfecties, bijvoorbeeld na het eten van met campylobacter besmet kippenvlees, goed te behandelen. Veel bacteriën, die zowel bij mensen als bij vleeskippen geïsoleerd werden, zijn namelijk resistent tegen fluoroquinolonen.

Meer dan de helft van de onderzochte campylobacterbacteriën (55% bij zowel mens als kip maar ook 53% in het onderzochte kippenvlees) vertoont resistentie tegen ciprofloxacine, een geneesmiddel uit de groep fluoroquinolonen. Met datzelfde geneesmiddel salmonella goed

behandelen, dreigt ook heel moeilijk te worden want ook voor salmonella is het aantal resistente bacteriën (EU-gemiddelde van 42% bij kippen en 68% in het geteste kippenvlees) alarmerend hoog.

Het goede nieuws komt van de vaststelling dat de werkzaamheid van de ‘antibiotica van de laatste hoop’ gevrijwaard wordt omdat er op vandaag al redelijk zorgvuldig mee omgesprongen wordt. Op vleesvarkens en kalkoenen werden geen resistente salmonellabacteriën gevonden, bij kippen 0,3 procent van de isolaten en bij mensen 0,2 procent. Ook voor campylobacter lijkt er niet meteen een groot resistentiegevaar: 0,5 procent bij vleeskippen en 1,1 procent bij rundvee. Van een andere veel voorkomende soort campylobacter, *C. coli* (de voorgaande cijfers sloegen op *C. jejuni*, *nvdr.*), stijgt de resistentie bij dieren helaas naar 12,3 procent bij kippen en 19,5 procent bij varkens.

Meer info: [EFSA](#)

VILT vzw

Bd Simon Bolivar 17
1000 Bruxelles

Contact

M • info@vilt.be

Volg ons op:

screenreader.visit us on our facebook page: <https://www.facebook.com/vilt.nieuws/>

screenreader.visit us on our linkedin page: <https://www.linkedin.com/company/vilt-vzw/>

screenreader.visit us on our instagram page: <https://www.instagram.com/vilt.nieuws>

screenreader.visit us on our x page: https://x.com/vilt_nieuws

screenreader.visit us on our bluesky page: <https://bsky.app/profile/viltnieuws.bsky.social>

© 2026 VILT vzw, all rights reserved |

[Privacy policy](#)

[Copyright](#)

[Cookie Policy](#)

[Cookie instellingen aanpassen](#)

Webdesign by [Who Owns The Zebra](#)